



Power In-Service
Training Center | Your Success is our Priority

Errores de medicación


- Definición

El Consejo Nacional de Coordinación de Medicamentos Información y Prevención de Error (2005)


"Cualquier evento prevenible que puede causar o conducir a un uso inapropiado de la medicación o de daño al paciente mientras el medicamento está en el control de los profesionales de la salud, pacientes, o de los consumidores. Tales eventos pueden estar relacionados con la práctica profesional, los productos de cuidado de la salud, los procedimientos y los sistemas, incluidas las órdenes de prescripción, comunicación, etiquetado de productos, el embalaje, y la nomenclatura, composición, dosificación, distribución, administración, educación, vigilancia, y utilizan "

Errores de medicación


- Preparación de medicamentos con poca luz
Verter medicamentos para más de un cliente a la vez
Medicamentos pre-vertido
DISTRACCIONES!
Hablar con otras personas
Hablar por el teléfono celular, o los mensajes de texto
Ver la TV o escuchar la radio
Asistir a otras tareas mientras se preparan medicamentos



¿Qué podría causar un error de medicación?

- 
- Un error de medicación es la siguiente acción:
 - medicación incorrecta
 - Una dosis incorrecta
 - Ruta equivocada
 - Razón equivocada
 - Cliente incorrecto
 - Mal momento
 - No documentar inmediatamente o precisión
 - No cargar o recargar los medicamentos actuales a tiempo
 - Dar medicamentos etiquetados incorrectamente
 - El no poder realizar la medicación precisa de medicamentos controlados

Error Medicamentos (Formulario 65G7.05)

- 
- Un error podría causar daños graves
Observar (llame al 911 si es aplicable)
Notifique a su supervisor (según la política de la agencia)
Notificar al HCP
Rellene el informe de errores de medicación
Para instalación de administrador / supervisor de
Para APD MCM dentro de las 24 horas de descubrimiento
Mantenga informe de error en el archivo de cliente si en SL o FH

¿Qué hago después?

- Los clientes tienen el derecho de rechazar todas o algunas de sus medicamentos.

¿Qué debe hacer?

Educar y estimular a tomar medicamentos no

Notifique supervisor y WSC

Notificar al HCP


Documento en el expediente del cliente

Si el cliente es incapaz o menor de edad

Notificar al Guardian y WSC inmediatamente

Documento de registro del cliente

Un error de medicación y no un rechazo de medicación?

- 
- Todos los medicamentos bajo llave en un armario / carro a la temperatura normal
Controlled Drugs-Double bloqueado
Se mantuvo en el envase original
Separados de otros medicamentos clientes
Cada ruta de la medicación separados por barreras físicas de otras rutas
Refrigerados cuando sea necesario (bloqueado)
Las claves deben ser guardados en lugar seguro que es inaccesible a los clientes

Almacenamiento de Medicamentos

- ¿Qué medicamento debe ser destruido?

-Suspendido

-Expirado

Dos posibilidades de reciclar

- Volver a la farmacia en una caja sellada o paquete de burbuja
- Consulte con su farmacéutico sobre la práctica de destrucción segura.
- Se necesitan dos personas para destruir, testigos y documentos en forma

Forma para Destrucción Medicamentos

APD 65G7-06

- Cuando un cliente está lejos de un centro residencial con licencia o en el hogar de apoyo residencial y necesitará asistencia para medicamentos por alguien que no sea MAP

- Medicación suficiente se debe proporcionar para todas las dosis necesarias, mientras que fuera
- Debe ser enviado en los envases originales
- Sólo cliente que está autorizado para administrar medicamentos auto sin supervisión puede utilizar un "cuidador píldora"
- Medicamentos deben ser contados cuando se proporciona, y cuando regresaron, a través del "Formulario de Medicamentos Off-Site" 65G7-08
- MAP debe proporcionar el nombre y la persona de contacto, y el nombre y número de teléfono de HCP del cliente

Medicamentos Fuera del Sitio